Linprel Multidosis

Pregabalina 75 mg

Baliarda

Expendio bajo receta archivada
Industria Argentina
Comprimidos birranurados

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Que contiene Linprel?
Contiene pregabalina, una sustancia que pertenece a una clase de medicamentos denominados antiepilépticos.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Linprel?
Linprel está indicado para el tratamiento de:
• Dolor neuropático asociado a neuropatía diabética periférica.
• Neuralgia postherpética.
• Adyuvante en pacientes adultos con convulsiones de inicio parcial.
• Fibromialgia.
• Ansiedad generalizada en adultos (según criterios DSM IV).
• Dolor neuropático post-injuria espinal.

¿En qué casos no debo tomar Linprel?
No debe tomarlo si usted sufre alergia a la pregabalina o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver “Información adicional”).

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
- Ha tenido un empeoramiento del humor depresivo o se ha sentido intranquilo, ansioso, irritable, agresivo, impulsivo.
- Tiene antecedentes de episodios de angioedema (hinchazón de la cara, boca, labios, lengua, garganta) ó está siendo tratado concomitantemente con otros medicamentos asociados a angioedema (como inhibidores de la ECA: enalapril, lisinopril).
- Se encuentra bajo tratamiento con tiazolidinadionas (como pioglitazona, rosiglitazona).
- Se encuentra bajo tratamiento con medicamentos antiespásticos (como, metocarbamol, metaxalona, orfenadrina).
- Se encuentra bajo tratamiento con drogas que potencian el estreñimiento (como analgésicos opiáceos: codeína, fentanilo).
- Padece problemas cardíacos incluyendo insuficiencia cardíaca y arritmias.
- Presenta alteraciones oculares.
- Padece dolor muscular o debilidad, en particular si se acompaña de malestar o fiebre.
- Presenta sangrado o tiene bajo recuento de plaquetas en sangre.
- Presenta problemas renales.
- Usa o ha usado drogas de abuso, o consume o ha consumido en exceso medicamentos con receta médica.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?
Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:
- Rosiglitazona y pioglitazona (hipoglucemiantes orales).
- Oxicodona.
- Lorazepam.

¿Qué dosis debo tomar de Linprel y por cuánto tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.
Para su información, de acuerdo a la indicación, las dosis orientativas son:

Indicación	Dosis inicial	Dosis Máxima
Fibromialgia	150 mg/día (75 mg 2 veces/día o 50 mg 3 veces/día)	450 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias
Dolor neuropático		Dolor neuropático asociado con neuropatía periférica diabética: 300 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
		Neuralgia post-herpética: 600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
Dolor neuropático		Dolor neuropático post-injuria espinal: 600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
Pacientes con convulsiones de inicio parcial		600 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias
Trastorno de ansiedad generalizada en adultos		600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Linprel?
Sí, si usted padece de insuficiencia renal moderada o severa, es posible que el médico modifique la dosis.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Linprel?
No es necesario modificar la dosis de Linprel si usted padece de insuficiencia hepática.

¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis de Linprel?
Si, en pacientes ancianos con función renal disminuida, es probable que el médico modifique la dosis.

¿Cómo debo tomar Linprel?
La dosis diaria indicada debe administrarse en dos a tres tomas por día, con o sin alimentos.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Linprel?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Linprel?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Linprel mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de Linprel, consulte inmediatamente a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-2247 / 4962-6666.
Hospital Posadas:
011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Linprel?
Como todos los medicamentos, Linprel puede causar efectos indeseables en algunos pacientes.
Los efectos indeseables que se han observado con pregabalina incluyen: mareos, somnolencia, sequedad bucal, edema, visión borrosa, aumento de peso, trastornos del pensamiento (principalmente dificultad de concentración/atención).
Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Puedo operar maquinarias peligrosas o conducir automóviles durante el inicio del tratamiento con Linprel?
Linprel puede causar mareos y somnolencia. Evite realizar estas actividades hasta que usted conozca cómo le afecta Linprel.

¿Puedo consumir alcohol durante el tratamiento con Linprel?
No tome alcohol durante el tratamiento con Linprel, ya que puede provocar efectos indeseables.

¿Cómo debo conservar Linprel?
Debe conservarse a una temperatura no superior a los 30ºC y protegido de la humedad.
No utilice Linprel después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada comprimido birranurado de contiene:
Pregabalina 75,0 mg
Excipientes: Starlac 100 (lactosa monohidrato: almidón de maíz), lauril sulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, óxido férrico amarillo, talco, estearato de magnesio, Prosolv HD 90 (celulosa microcristalina: dióxido de silicio coloidal), c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:
Linprel Multidosis
Envases con 15 y 30 comprimidos.


Comprimidos rectangulares, color amarillo claro, birranurados.

"Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia médica, y no puede repetirse sin nueva receta médica"

Este Medicamento es Libre de Gluten

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Linprel en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde:
0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:
4122-5818

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.589
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Enero 2016

Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4209109