

# Exertial 500

Ciprofloxacina 500 mg



Expendio bajo receta archivada  
Industria Argentina

**Comprimidos recubiertos ranurados**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo síntoma, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o, si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Qué contiene Exertial?

Contiene una sustancia llamada *ciprofloxacina*, la cual pertenece a un grupo de medicamentos llamados antibióticos. *Ciprofloxacina* es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas, de amplio espectro.

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Exertial?

Exertial está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por las cepas de microorganismos sensibles a ciprofloxacina, tales como:

- Infecciones del tracto urinario
- Prostatitis bacteriana crónica
- Uretritis y cervicitis gonocócica
- Diarrea infecciosa
- Infecciones intraabdominales complicadas
- Infecciones de la piel y estructuras cutáneas
- Infecciones del hueso y articulaciones

- Fiebre tifoidea o entérica
- Antrax inhalatorio postexposición
- Peste

Asimismo, Exertial está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones, pero sólo cuando el uso de los antibacterianos comúnmente indicados se considere inapropiado:

- Cistitis aguda no complicada (en mujeres adultas)
- Infecciones del tracto respiratorio inferior
- Sinusitis aguda

### ¿En qué casos no debo tomar Exertial?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico a ciprofloxacina u otros antibióticos fluoroquinolónicos, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Tiene antecedentes de problemas de tendón debido a fluoroquinolonas (como tendinitis, ruptura de tendón a nivel del hombro, de la mano o tendón de Aquiles).
- Se encuentra bajo tratamiento con tizanidina.
- Está embarazada o amamantando.

No debe administrarse en niños y adolescentes en período de crecimiento.

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Se encuentra bajo tratamiento con corticoides o ha recibido un trasplante de riñón, pulmón o corazón, especialmente si es mayor de 60 años.
- Padece miastenia gravis o tiene historia familiar de esta enfermedad.
- Presenta temblor, intranquilidad, ansiedad, confusión, alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas, insomnio, ideación suicida.
- Tiene antecedentes o predisposición a crisis convulsivas.
- Se encuentra bajo tratamiento con teofilina.
- Presenta sensación de hormigueo, hinchazón de cara o faringe, falta de aire, urticaria (erupción en la piel) o picazón.
- Presenta diarrea durante o después del tratamiento con

ciprofloxacina.

- Presenta signos de neuropatía periférica como dolor, ardor, hormigueo, adormecimiento y/o debilidad, o sensaciones de dolor al menor contacto, temperatura o alteraciones de la sensibilidad.

- Presenta fiebre, rash, vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos), artralgia (dolor en las articulaciones), mialgia (dolor muscular), neumonitis alérgica.

- Presenta problemas renales.

- Presenta problemas hepáticos severos o síntomas sugerentes de hepatitis: anorexia, ictericia, orina oscura, prurito (picazón), abdomen sensible.

- Tiene niveles bajos de potasio o magnesio en sangre.

- Se encuentra bajo tratamiento con antiarrítmicos (como quinidina, procainamida, amiodarona, sotalol), antidepressivos tricíclicos (como imipramina, desipramina), macrólidos (como claritromicina, azitromicina), o antipsicóticos (como clorpromazina, tioridazina).

- Ha padecido anteriormente o presenta reacciones de fotosensibilidad/fototoxicidad (enrojecimiento o formación de ampollas en la piel debido a exposición solar).

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, antiácidos (que contengan magnesio, aluminio o calcio), sucralfato, cationes metálicos (como hierro), didanosina, multivitamínicos (que contengan zinc) o suplementos dietarios. En especial, infórmele si está bajo tratamiento con medicamentos como: cafeína, ciclosporina, warfarina, metotrexato, ropinirol, clozapina, probenecid, fenitoína, antidiabéticos orales (como gliburida, glicipizida), AINES, sildenafil, duloxetina, lidocaína, metoclopramida.

### **¿Qué dosis debo tomar de Exertial y por cuánto tiempo?**

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

La dosis y duración del tratamiento será establecida por el médico, en función del tipo de infección.

### **¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Exertial?**

Sí, si usted padece problemas renales, es probable que su médico modifique la dosis.

### **¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Exertial?**

No, no es necesario modificar la dosis si usted padece insuficiencia hepática.

### **¿En los pacientes de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Exertial?**

No, no es necesario modificar la dosis, en pacientes de edad avanzada con función renal normal.

### **¿Cómo debo tomar Exertial?**

Los comprimidos de Exertial deben ingerirse enteros, o partidos por su ranura para adaptar la dosis, con o fuera de las comidas, de preferencia 2 horas después de la ingesta de alimentos.

Deben administrarse al menos 2 horas antes, o 6 horas después, de antiácidos que contengan magnesio o aluminio, así como sucralfato, didanosina, cationes metálicos y/o multivitamínicos que contengan zinc. No se recomienda tomar el producto con leche, yogur o jugos fortificados con calcio.

### **¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Exertial?**

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que sea casi la hora de su siguiente dosis. En tal caso, no ingiera más de una dosis.

### **¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Exertial mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada de Exertial, con-

sulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

### **¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Exertial?**

Como todos los medicamentos, Exertial puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.

Las reacciones adversas que se han reportado con mayor frecuencia con ciprofloxacina, incluyen: náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, malestar, rash.

Si usted presenta alguna de estas reacciones adversas o cualquier otra no mencionada aquí, consulte a su médico.

### **¿Cómo debo conservar Exertial?**

Exertial debe conservarse a una temperatura no mayor de 30°C, preferentemente en su envase original. Proteger de la humedad.

No utilice Exertial después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

## **INFORMACION ADICIONAL**

### **Composición:**

Cada comprimido recubierto ranurado contiene:

Ciprofloxacina (como clorhidrato monohidrato) 500,0 mg.

Excipientes: estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, povidona, polietilenglicol 6000, croscarmelosa sódica, talco, propilenglicol.

### **Contenido del envase:**

Envases con 10 y 14 comprimidos recubiertos ranurados.



Comprimidos oblongos, color blanco, ranurados.

**“Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica”.**

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Exertial en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:**

 **4122-5818**

Especialidad medicinal autorizada

por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.453

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires



Este Medicamento  
es Libre de Gluten

Última revisión: Septiembre 2017



**Baliarda S.A.**

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires